

Le groupe des *Ophrys sphegodes* est un véritable casse-tête pour la détermination des différents taxons.

- J'ai essayé par ce diaporama de trouver une aide à la détermination « hors hybrides » .

Pour pouvoir le lire : mettez en diaporama et actionnez les boutons d'actions :

- Bleu (suivante ou taxons)**
- Rouge (confusion possible)**
- Jaune (retour aux taxons)**

Francis BONNET 2013

Suivante



ORCHIDÉES

Aide à la
Détermination

Ophrys

Sections des *Araniferae*

Suivante



Ophrys massiliensis -----



Ophrys litigiosa -----



Ophrys exaltata arachnitiformis -----



Ophrys exaltata marzuola -----



Ophrys aranifera -----



Autres Taxons 

Ophrys virescens -----



Ophrys passionis -----



Ophrys incubacea -----



Ophrys splendida -----



Ophrys aveyronensis -----



Retour diapositive précédente

FONTANES 14 III 08




Ophrys massiliensis

- Floraison très précoce, février, mars à basse altitude, **domaine méditerranéen.**
- Tige frêle
- Fleurs petites (*araneola* par exemple)
- Gynostème à angle très fermé, 60° à 80° par rapport au labelle
- Champ basal rouge ou orangé
- Cavité stigmatique plus large que haute
- Gibbosités + ou - présentes

Confusion possible avec :

- *Ophrys exaltata arachnitiformis*



- *Ophrys exaltata marzuola*



Retour aux taxons


Suivante



Caractères distinctifs primordiaux outre la précocité de floraison

Angle gynostème et labelle très fermé

Champ basal orangé ou rouge



Retour à *O massiliensis*

Suivante



FONTANES 14 III 08



Cavité stigmatique plus large que haute

pseudo-yeux verdâtres



Retour à *O massiliensis*



Ophrys litigiosa

Syn: Ophrys araneola

- Fleurs petites
- Tige forte, paraissant surdimensionnée par rapport aux fleurs
- Labelle avec marge jaune plus ou moins large toujours présente
- Floraison précoce : mars, avril

Confusion possible avec :

- *Ophrys virescens*



Retour aux taxons


Suivante



Caractères distinctifs

Labelle bombé, gibbosités faibles ou absentes

Cavité stigmatique plus large que haute



Macule en forme de X ou de H, bleutée

Bord jaune du label récurvé



Retour à *O litigiosa*

Ophrys exaltata arachnitiformis

PORTELS Des CORBIERES 15 III 04



Syn : Ophrys arachnitiformis

Floraison précoce, février, mars.

- Tige haute, forte,
- Fleurs grandes.
- Rare à absente Aude et P.O
- Gibbosités souvent présentes

Confusion possible avec :

- *Ophrys exaltata marzuola*




Retour aux taxons

Suivante




Caractères distinctifs

Sépales de couleur pâle avec une ligne médiane vert foncé



Cavité stigmatique plus haute que large, pseudo-yeux proéminents, globuleux de couleur noirâtre



Pétales de couleur plus foncé que les sépales, à bords sinueux de couleur plus foncé (ici rougeâtre)



Retour à *O exaltata arachnitiformis*



Ophrys exaltata marzuola


Syn : Ophrys occidentalis

Floraison mars, avril

- Tige forte, hauteur variable
- Fleurs grandes, de forme et couleur variables
- Pétales et sépales verdâtres, exceptionnellement rosé ou blanche
- Macule très variable
- Appendice présent, souvent proéminent

Confusion possible avec :

- *Ophrys exaltata arachnitiformis*



- *Ophrys aranifera*




Retour aux taxons

Suivante



Caractères distinctifs :

Angle gynostème, labelle
très ouvert : 90°



Champ basal concolore avec le labelle.
Cavité stigmatique, plus haute que large.
Pseudo-yeux ronds, proéminents.



Retour à *O. exaltata marzuola*

Suivante





Exemple de variabilité des fleurs



Retour à *O exaltata marzuola*

JONCELS 22 IV 07



Ophrys aranifera

Syn : Ophrys sphegodes

- Floraison d'avril à mai
- Tige robuste, fleurs nombreuses
- Labelle paraissant allongé
- Gynostème à bec court, faisant un angle fermé avec le labelle
- Appendice très petit

Confusion possible avec :

- *Ophrys exaltata arachnitiformis*



- *Ophrys exaltata marzuola*



Retour aux taxons

Suivante



Caractères distinctifs :



Champ basal toujours plus clair que le labelle

Macule souvent bleuâtre



Cavité stigmatique, plus large que haute
Pseudo-yeux verdâtres



Retour à *O aranifera*



Ophrys virescens

Ressemble à *O litigiosa*, mais :

- Tige plus grêle
- Pétales un peu plus larges et plus foncés
- Labelle très bombé, gibbosités absentes
- Floraison tardive : avril à fin mai, 1 mois après *O litigiosa*
- Aspect d'un petit *O passionis*

Confusion possible avec :

- *Ophrys litigiosa*




[Retour aux taxons](#)

[Suivante](#)



Caractères distinctifs :

Pétales larges, de couleur plus foncés



Sépale dorsal égal ou plus long que le labelle



Retour à *O virescens*



Ophrys passionis

- Floraison de mars à mai
- Port robuste
- Fleurs grandes, peu nombreuses
- Pétales très grands, larges à bords sinueux, verts souvent teintés de pourpre
- Labelle très grand, bords pubescents, gibbosités absentes
- Champ basal sombre



[Retour aux taxons](#)

[Suivante](#)



Caractères distinctifs :



Pétales grands, très larges

Labelle grand,
Faiblement
trilobés
Bords à forte
pilosités



Retour à *O passionis*



Ophrys incubacea

- Floraison de mars à mai
- Tige grêle, port élané
- Fleur assez grande
- Labelle allongé, maculé en forme de H
- Champ basal sombre, concolore avec le labelle
- Gibbosités fortes, dressées avec la face interne glabre, brillante. Face externe à forte pilosité

ENSERUNES 22 IV 05



[Retour aux taxons](#)

[Suivante](#)



Caractères distinctifs :



Pétales lancéolés,
à bords ondulés

Face externe à
forte pilosité

Gibbosités très fortes, face interne glabre,
brillante



Retour à *O incubacea*



O splendida

- Floraison tardive, fin avril à mai
- Domaine méditerranéen,
- **Ne dépasse pas Nîmes vers l'Ouest**
- Port élégant, « splendide »
- Fleurs de grandes dimensions
- Sépales blancs ou roses, pétales bicolores
- Labelle convexe à marge glabre de couleur jaune, gibbosités faibles à absentes



Retour aux taxons


Suivante



Caractères distinctifs :

Pétales bicolores, sépales rosés

ST BONNET du GARD 25 IV 09



Macule bordée d'un fin liseré blanc



ST BONNET du GARD 25 IV 09

Appendice absent ou très petit



Retour à *O splendida*



Ophrys aveyronensis

Endémique des Causses, Aveyron, Larzac

- Plante à port robuste
- Fleurs grandes, très colorées
- Sépales de couleur rose. Pétales rose vif à rouge vif avec les bords teintés de jaune à rouge orangé
- Labelle entier, souvent plus large que long avec une large bordure velue
- Macule morcelée, très étalée, différente d'une fleur à l'autre
- Floraison de mai à juin

LAPANOUSE de CERNON 20 V 04



Retour aux taxons

Suivante



Caractères distinctifs :



Sépales roses

Pétales roses ou rouge vif, marge orangée

Macule complexe

Bords du labelle très pubescents



Début



 Retour à *O aveyronensis*